

소아환자 보호자의 단순상기도 감염 환자에 대한 주사제 선호도

윤상일, 최혜경, 이석환

대구의료원 가정의학과

연구배경: 현재 가정의학과를 포함한 일차 의료기관에서 소아 단순 상기도감염 환자의 수는 전체 내원 환자의 상당히 많은 부분을 차지하고 있다. 일부 의사들은 소아 단순 상기도감염의 주사제 사용에 대한 불필요성은 공감하면서도, 현실적인 이유로 주사제를 자주 처방하고 있는 실정인데, 그 이유 중의 하나가 소아 환자 보호자가 주사제를 선호할 것이라는 의사 스스로의 판단 때문이다. 그러나 과거와 달리 주사제 오남용에 대한 교육 및 홍보를 접할 기회가 많아진 현재, 소아 환자 보호자의 실제 주사제 선호성향 및 선호하게 되는 배경을 조사해 보고자 하였다.

방법: 2002년 5월부터 2002년 6월까지 대구지역 일개 종합병원에서 단순 상기도 감염으로 진단된 소아 환자 보호자 291명에게 자기기입식 설문지를 작성하게 하여 성실하게 응답한 248명을 대상으로 하였다. 조사 내용은 대상자의 인구사회학적 특성, 단순 상기도감염 치료시 주사제 사용의 불필요성에 관한 교육 유무, 단순 상기도감염 치료시 주사제 선호유무에 관한 것으로 하였다.

결과: 대상자 248명 중 남자 28명(11.3%), 여자 220명(88.7%)이었으며, 평균 나이는 33.6 ± 6.0 세였다. 주사제 선호군은 119명(48.0%), 비선호군은 129명(52.0%)으로 조사되었다.

주사제 선호도는 학력이 높을수록, 가족내 의료인이 있을때, 언론 매체를 통해 단순 상기도감염 치료시 주사제 사용의 불필요성에 관한 교육 및 홍보를 접한 적이 있는 경우에 유의하게 낮은 것으로 나타났다.

결론: 소아 단순 상기도감염 치료시 의학적 근거가 부족한 주사제 사용에 관한 소아 환자 보호자의 인식뿐만 아니라, 보호자가 주사제를 선호할 것이라는 의사들의 인식을 바꿀 필요가 있다. 따라서 소아 환자 보호자를 대상으로 언론매체와 같은 다양한 방법을 이용한 교육 및 홍보를 꾸준히 해나가야 하며, 의사들도 주사제 처방을 줄이도록 노력해야 할 것이다.

중심단어 : 소아 단순 상기도감염, 보호자, 주사제 선호도